

FRONTPRO 11 mg comprimés à croquer pour chiens 2–4 kg, FRONTPRO 28 mg comprimés à croquer pour chiens >4–10 kg, FRONTPRO 68 mg comprimés à croquer pour chiens >10–25 kg, FRONTPRO 136 mg comprimés à croquer pour chiens >25–50 kg. **SUBSTANCE ACTIVE : Un comprimé à croquer contient : chiens 2–4 kg : 11,3 mg d'afoxolaner. Chiens >4–10 kg : 28,3 mg d'afoxolaner. Chiens >10–25 kg : 68 mg d'afoxolaner. Chiens >25–50 kg : 136 mg d'afoxolaner. **PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE** : Médicament vétérinaire non soumis à ordonnance. **INDICATIONS** : Chez les chiens, traitement des infestations par les puces (*Ctenocephalides felis* et *C. canis*). Un traitement assure une activité insecticide immédiate et persistante contre les puces pendant 5 semaines. Chez les chiens, traitement des infestations par les tiques (*Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus*, *Ixodes hexagonus*, *Rhipicephalus sanguineus*). Un traitement assure une activité insecticide immédiate et persistante contre les tiques pendant un mois. Les puces et les tiques doivent s'attacher à l'hôte et commencer leur repas pour être exposés à la substance active. **CONTRE-INDICATIONS** : Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients. **EFFETS INDÉSIRABLES** : Chiens. Très rare (< 1 animal / 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés) : signes neurologiques (convulsions, ataxie et tremblements musculaires) ; affections de la peau et des annexes (prurit) ; affections systémiques (léthargie, anorexie) ; généralement légère, affections gastro-intestinales bénignes (vomissements et diarrhée). La plupart de ces effets indésirables rapportés ont été de courte durée et ont disparu spontanément. **Mise à jour du texte** : 25.01.2024 (Version 02).**

FRONTCONTROL WORMER COMPRIMÉS POUR CHATS. FRONTCONTROL WORMER COMPRIMÉS POUR CHIENS. FRONTCONTROL WORMER XL COMPRIMÉS POUR CHIENS. Substances actives : Chaque comprimé pelliculé pour chats contient : 230 mg d'émbonate de pyrantel (équivalent à 79,79 mg de pyrantel), 20 mg de praziquantel. Chaque comprimé pour chien contient : 50,00 mg de praziquantel, 50,00 mg de pyrantel (équivalent à 144 mg d'émbonate de pyrantel), 150,00 mg de fébantel. Chaque comprimé XL pour chien contient : 175,00 mg de praziquantel, 175,00 mg de pyrantel (équivalent à 504 mg d'émbonate de pyrantel), 525,00 mg de fébantel. **Prescription et délivrance** : Médicament vétérinaire soumis à ordonnance, sauf pour certaines présentations. **Indications** : **Chats** : Traitement des infestations mixtes par les nématodes et les cestodes des espèces suivantes : nématodes : *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina* ; cestodes : *Dipylidium caninum*, *Taenia taeniaeformis*, *Echinococcus multilocularis*. **Chiens** : Traitement des infestations mixtes par les nématodes et les cestodes des espèces suivantes : nématodes : ascarides (*Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (formes adultes et immatures tardives)), ankylostomes (*Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* (adultes)), trichocéphales (*Trichuris vulpis* (adultes)) ; cestodes : ténias (*Echinococcus sp.*, (*E. granulosus*, *E. multilocularis*), *Taenia sp.*, (*T. hydatigena*, *T. pisiformis*, *T. taeniformis*), *Dipylidium caninum* (formes adultes et immatures)). **Contre-indications** : **Chats et Chiens** : Ne pas utiliser simultanément avec des composés de la famille de la pipérazine. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients. **Chats** : Ne pas utiliser chez des chatons âgés de moins de 6 semaines. **Effets indésirables** : **Chats** : Très rare : troubles digestifs (tels qu'hypersalivation et/ou vomissements) ; signes neurologiques (ataxie). **Chiens** : Très rare : troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements). **Mise à jour du texte** : 20.03.2024 (Version 1.0).

FRONTLINE COMBO spot-on chien S, FRONTLINE COMBO spot-on chien M, FRONTLINE COMBO spot-on chien L, FRONTLINE COMBO spot-on chien XL. Substances actives : Chien S : Une pipette de 0,67 mL contient 67,00 mg de fipronil et 60,30 mg de (S)-méthoprène. Chien M : Une pipette de 1,34 mL contient 134,00 mg de fipronil et 120,60 mg de (S)-méthoprène. Chien L : Une pipette de 2,68 mL contient 268,00 mg de fipronil et 241,20 mg de (S)-méthoprène. Chien XL : Une pipette de 4,02 mL contient 402,00 mg de fipronil et 361,80 mg de (S)-méthoprène. **Prescription et délivrance** : Médicament vétérinaire non soumis à ordonnance. **Indications** : À utiliser contre les infestations par les puces seules ou les infestations mixtes par les puces et tiques et/ou pour broyeur : traitement de l'infestation par les puces (*Ctenocephalides spp.*). L'efficacité

insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant 8 semaines. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des oeufs (activité ovicide) et des larves et pupes (activité larvicide) issues des oeufs pondus par les puces adultes pendant 8 semaines après application. Traitement de l'infestation par les tiques (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*). Le médicament vétérinaire a une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste jusqu'à 4 semaines. Traitement de l'infestation par les poux broyeur (*Trichodectes canis*). Le médicament vétérinaire peut être intégré dans un programme de traitement de la Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces (DAPP). **Contre-indications** : En l'absence de données disponibles, le médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé chez les chiots de moins de 8 semaines et/ou pesant moins de 2 kg. Ne pas utiliser chez les lapins, car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu. En l'absence d'études, l'utilisation du médicament vétérinaire n'est pas recommandée pour les espèces non-cibles. Ne pas utiliser chez les animaux malades (par exemple : maladies systémiques, fièvre) ou convalescents.. Ce médicament vétérinaire a été spécialement développé pour les chiens. Ne pas utiliser chez les chats et les furets car cela peut conduire à un surdosage. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients. **Effets indésirables** : Très rare (< 1 animal / 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés) : Réactions transitoires au site d'application (décoloration de la peau, perte de poils, démangeaison, rougeur) ; démangeaisons ou perte de poils généralisées ; salivation excessive (En cas de léchage, une brève période de salivation excessive due principalement à la nature de l'excipient peut être observée) ; vomissements ; symptômes respiratoires ; augmentation de la sensibilité à la stimulation (réversible), abattement (réversible), autres signes nerveux (réversibles).
Mise à jour du texte : 07.05.2024 (Version 7).

FRONTLINE COMBO SPOT-ON CHAT. Espèces cibles : Chats et furets. **Substances actives** : Une pipette de 0,5 mL contient 50,00 mg Fipronil et 60,00 mg de (S)-méthoprène. **Prescription et délivrance** : Médicament vétérinaire non soumis à ordonnance. **Indications** : Chez les chats : à utiliser contre les infestations par les puces seules ou des infestations mixtes par les puces et tiques et/ou poux broyeur : élimination des puces (*Ctenocephalides spp.*). L'efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant 4 semaines. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des oeufs (activité ovicide) et des larves et pupes (activité larvicide) issues des oeufs pondus par les puces adultes, pendant six semaines après application. Élimination des tiques (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*). Le médicament vétérinaire a une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste selon les données expérimentales jusqu'à 2 semaines. Élimination des poux broyeur (*Felicola subrostratus*). Le médicament vétérinaire peut être intégré dans un programme de traitement de la Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces (DAPP). Chez les furets : A utiliser contre les infestations par les puces seules ou des infestations mixtes par les puces et tiques. Élimination des puces (*Ctenocephalides spp.*). L'efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant 4 semaines. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs (activité ovicide) et des larves et pupes (activité larvicide) issues des œufs pondus par les puces adultes. Élimination des tiques (*Ixodes ricinus*). Le médicament vétérinaire a une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste (selon les données expérimentales) jusqu'à 4 semaines. **Contre-indications** : En l'absence de données disponibles, le médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé chez les chatons de moins de 8 semaines et/ou pesant moins de 1 kg. Le médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé chez les furets de moins de 6 mois. Ne pas utiliser chez les lapins, car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu. En l'absence d'études, l'utilisation du médicament vétérinaire n'est pas recommandée chez les espèces non-cibles. Ne pas utiliser chez les animaux malades (par exemple : maladies systémiques, fièvre) ou convalescents. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients.. **Effets indésirables** : Très rare (< 1 animal / 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés) : Réactions transitoires au site d'application (desquamation, perte de poils,

démangeaison, rougeur) ; démangeaisons ou perte de poils généralisées ; salivation excessive (En cas de léchage, une brève période de salivation excessive due principalement à la nature de l'excipient peut être observée) ; vomissements ; augmentation de la sensibilité à la stimulation (réversible), abattement (réversible), autres signes nerveux (réversible).

Mise à jour du texte : 07.05.2024 (Version 8)

FRONTLINE spot-on chien S, FRONTLINE spot-on chien M, FRONTLINE spot-on chien L, FRONTLINE spot-on chien XL. SUBSTANCE ACTIVE ACTIFS : Chien S : une pipette de 0,67 mL contient 67,000 mg de fipronil. Chien M : une pipette de 1,34 mL contient 134,00 mg de Fipronil. Chien L : une pipette de 2,68 mL contient 268,000 mg de fipronil. Chien XL : Une pipette de 4,02 mL contient 402,000 mg de fipronil. **PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE** : Sans objet. **INDICATIONS** : Affections à parasites sensibles au fipronil. Traitement curatif et préventif des infestations par les puces et par les tiques. Elimination des poux broyeurs. La durée de protection contre les nouvelles infestations est de deux mois pour les puces et d'un mois pour les tiques. Le médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite Allergique par Piqûres de Puces (DAPP). **CONTRE-INDICATIONS** : En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chiots de moins de 8 semaines ou pesant moins de 2 kg. Ne pas utiliser chez les animaux malades (maladies systémiques, fièvre.) ou convalescents. Ne pas utiliser chez les lapins car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu. Ce produit a été spécialement développé pour les chiens. Ne pas utiliser chez les chats car cela peut conduire à un surdosage. **EFFETS INDÉSIRABLES** : En cas de léchage, une brève période d'hypersalivation principalement due à la nature de l'excipient peut être observée. Parmi les effets secondaires extrêmement rarement suspectés, des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application (décoloration de la peau, alopecie locale, prurit, érythème) ainsi que du prurit ou une alopecie généraux ont été rapportés. Exceptionnellement, de l'hypersalivation, des symptômes neurologiques réversibles (hyperesthésie, abattement, symptômes nerveux), des vomissements ou des symptômes respiratoires ont été observés après utilisation. Ne pas surdoser.

Mise à jour du texte : 12.06.2023 (Version 5).

FRONTLINE spot-on chat. SUBSTANCE ACTIVE : Une pipette de 0,5 mL contient 50,00 mg de fipronil. **PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE** : Sans objet. **INDICATIONS** : Affections à parasites sensibles au fipronil. Chez les chats : traitement curatif et préventif des infestations par les puces (*Ctenocephalides felis*) et par les tiques. Elimination des poux broyeurs. La durée de protection contre les nouvelles infestations est de 4 semaines pour les puces et de 2 semaines pour les tiques. Le médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite Allergique par Piqûres de Puces (DAPP). **CONTRE-INDICATIONS** : En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chatons de moins de 8 semaines ou pesant moins de 1 kg. Ne pas utiliser chez les animaux malades (maladies systémiques, fièvre.) ou convalescents. Ne pas utiliser chez les lapins car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu. **EFFETS INDÉSIRABLES** : Des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application (desquamation, alopecie locale, prurit, érythème) ainsi que du prurit général ou une alopecie ont été rapportés dans de très rares cas. De l'hypersalivation, des symptômes neurologiques réversibles (hyperesthésie, abattement, autres symptômes nerveux) ou des vomissements ont également été observés dans de très rares cas. En cas de léchage, une brève période d'hypersalivation due à la nature de l'excipient peut être observée. Ne pas surdoser.

Mise à jour du texte : 12.06.2023 (Version 7).

FRONTLINE SPRAY pompe 0,5 mL, FRONTLINE SPRAY pompe 1,5 mL. ESPÈCES CIBLES: Chiens et chats. **SUBSTANCE ACTIVE** : Un mL contient 2,5 mg de Fipronil. **PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE** : Sans objet. **INDICATIONS** : Affections à parasites sensibles au fipronil chez les chiens et chats de moins de 5 kg. Chez les chiens : prévention

et traitement des infestations par les puces et les tiques. Elimination des poux broyeurs. La durée d'efficacité contre les nouvelles infestations par les puces varie de 60 à 90 jours. La durée d'efficacité contre les nouvelles infestations par les tiques est d'environ 30 jours. **Ches les chats** : prévention et traitement des infestations par les puces et les tiques. Elimination des poux broyeurs. La durée d'efficacité contre les nouvelles infestations par les puces est d'environ 40 jours. La durée d'efficacité contre les nouvelles infestations par les tiques est de 2 semaines. Le médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces (DAPP). **CONTRE-INDICATIONS** : Ne pas utiliser chez les animaux malades (maladies systémiques, fièvre.) ou convalescents. Ne pas utiliser chez les lapins, car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients. **EFFETS INDÉSIRABLES** : En cas de léchage, une brève période d'hypersalivation due à la nature de l'excipient peut être observée. Parmi les effets secondaires extrêmement rarement suspectés, des réactions cutanées transitoires, érythème, prurit ou alopecie ont été rapportés après utilisation. Exceptionnellement, de l'hypersalivation, des symptômes neurologiques réversibles (hyperesthésie, abattement, symptômes nerveux), des vomissements ou des symptômes respiratoires ont été observés après utilisation. Les effets observés sont susceptibles d'être plus sévères chez les chiots de moins de 6 mois. Ne pas surdoser.

Mise à jour du texte : 27.04.2020 (Version 4).

FRONTLINE TRI-ACT 33,8 MG / 252,4 MG SOLUTION POUR SPOT-ON POUR CHIENS 2 - 5 KG, FRONTLINE TRI-ACT 67,6 MG / 504,8 MG SOLUTION POUR SPOT-ON POUR CHIENS 5 - 10 KG, FRONTLINE TRI-ACT 135,2 MG / 1009,6 MG SOLUTION POUR SPOT-ON POUR CHIENS 10 - 20 KG, FRONTLINE TRI-ACT 270,4 MG / 2019,2 MG SOLUTION POUR SPOT-ON POUR CHIENS 20 - 40 KG, FRONTLINE TRI-ACT 405,6 MG / 3028,8 MG SOLUTION POUR SPOT-ON POUR CHIENS 40 - 60 KG. Substances actives : Chiens 2-5 kg : chaque pipette de 0,5 mL contient : 33,8 mg de fipronil et 252,4 mg de perméthrine. Chiens 5-10 kg : chaque pipette de 1 mL contient : 67,6 mg de fipronil et 504,8 mg de perméthrine. Chiens 10-20 kg : chaque pipette de 2 mL contient : 135,2 mg de fipronil et 1009,6 mg de perméthrine. Chiens 20-40 kg : chaque pipette de 4 mL contient : 270,4 mg de fipronil et 2019,2 mg de perméthrine. Chiens 40-60 kg : chaque pipette de 6 mL contient : 405,6 mg de fipronil et 3028,8 mg de perméthrine. **Prescription et délivrance** : **Médicament vétérinaire non soumis à ordonnance. Indications** : Pour le traitement et la prévention des infestations par les puces et/ou les tiques lorsqu'une activité répulsive (anti-gorgement) est nécessaire contre les phlébotomes, les mouches piqueuses et/ou les moustiques. Puces : Traitement et prévention des infestations par les puces *Ctenocephalides felis* et prévention des infestations par les puces *Ctenocephalides canis*. Un traitement prévient les nouvelles infestations par les puces pendant 4 semaines. Le médicament vétérinaire peut être intégré à une stratégie de traitement pour le contrôle de la dermatite par allergie aux piqûres de puces, quand celle-ci a été préalablement diagnostiquée par un vétérinaire. Tiques : Traitement et prévention des infestations par les tiques (*Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*). Un traitement élimine les tiques (*Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*), possède une activité répulsive contre les tiques (*Ixodes Ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) pendant 4 semaines après traitement, et possède une activité répulsive contre *Dermacentor reticulatus* à partir de 7 jours et jusqu'à 4 semaines après le traitement. Moustiques et Phlébotomes : Le médicament vétérinaire a une efficacité répulsive (anti-gorgement) pendant 3 semaines contre les phlébotomes (*Phlebotomus perniciosus*) et pendant 4 semaines contre les moustiques (*Culex pipiens*, *Aedes albopictus*). Le médicament vétérinaire a une efficacité insecticide rémanente pendant 3 semaines contre les phlébotomes (*Phlebotomus perniciosus*) et les moustiques (*Aedes albopictus*). Réduction du risque d'infection à *Leishmania infantum* transmis par les phlébotomes (*Phlebotomus perniciosus*) jusqu'à 4 semaines. L'effet est indirect de par l'action du produit sur le vecteur. Mouches d'étable : Le médicament vétérinaire possède une activité répulsive

(anti-gorgement) et tue les mouches d'étable (*Stomoxys calcitrans*) pendant 5 semaines.

Contre-indications : Ne pas utiliser chez les animaux malades ou convalescents. Ce médicament vétérinaire est destiné uniquement aux chiens. Ne pas utiliser chez les chats et les lapins, car des effets secondaires parfois létaux peuvent survenir. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux substances actives, ou à l'un des excipients.

Effets indésirables : Très rare : réactions au site d'application¹ (décoloration de la peau, perte de poils, démangeaison, rougeur) ; démangeaison généralisée, perte de poils généralisée, érythème : Hyperesthésie², tremblements musculaires², ataxie², autres signes neurologiques² ; Hyperactivité² ; Dépression², anorexie ; Vomissements, hypersalivation ; ¹Transitoire. ² Réversible. En cas de léchage du site d'application, une hypersalivation transitoire et des vomissements peuvent être observés.

Mise à jour du texte : 01.08.2024 (Version 8.0).